



تزریق آواستین



منبع: برونر سودارث


تاریخ بازنگری: فروردین ۱۴۰۵

مدیر گروه چشم: دکتر مهدی نوری متخصص چشم

واحد آموزش سلامت


عوارض و علائم مهم به دنبال تزریقات داخل چشمی:

- درد شدید در چشم
 - کاهش دید پیشرونده
 - تورم شدید پلکها
 - قرمزی شدید و پیشرونده
 - سردردی که با مسکنهای تجویز شده تسکین نیابد
- در صورت بروز هر یک از علائم فوق سریعاً به چشم پزشک مراجعه کنید.**



علائم زیر اهمیت کمی داشته ودلیلی برای مراجعه به پزشک نیست:

- احساس درد یا تحریک مختصر در قسمت تزریق که معمولاً چند ساعت تا یک دو روز طول می کشد.
- قرمزی یا تورم در محل تزریق که معمولاً در قسمت خارجی چشم است
- دیدن نقاط با سایه های متحرک که معمولاً ناشی از ذرات هوا یا خونریزی مختصر است و معمولاً چند ساعت تا یک دو روز طول می کشد.



تزریق آواستین؟

آواستین نام تجاری داروی بواسیزومب می باشد که تزریق آن در چشم جهت درمان اکثر بیماریهای چشم و مشکلات شبکیه مخصوصا افراد دیابتی مورد استفاده قرار گرفته و به کاهش افت دید در این بیماری ها کمک می کند.

مراقبتهای قبل از تزریق چشمی

➤ اگر چشم شما در روز تزریق، ملتهب یا عفونی است قبل از تزریق به پزشک خود اطلاع دهید.

➤ مصرف داروهای ضد انعقاد و ضد پلاکت مثل آسپرین و وارفارین معمولاً مغایرتی با تزریق داخل چشمی ندارد اما در صورت مصرف این داروها حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

➤ از به کار بردن وسایل آرایشی در اطراف چشم در روز تزریق و تا چند روز بعد از آن دوری کنید.

➤ مصرف بسیاری از داروهای تزریقی داخل چشمی در زمان بارداری و شیردهی ممنوع است. در صورت بارداری و یا شیردهی به پزشک خود اطلاع دهید.

➤ در صورت داشتن هر نوع حساسیت دارویی به پزشک خود اطلاع دهید.

➤ تزریق داروهای داخل چشمی در بیماران با سابقه سکته قلبی و مغزی کمتر از ۳ ماه، فشار خون شدید یا بالای کنترل نشده و بیماری قلبی کنترل نشده با احتیاط انجام می شود. قبل از تزریق این موارد را به پزشک خود اطلاع دهید.

مراقبتهای بعد از تزریق چشمی

قطره های چشمی تجویز شده را مطابق دستور پزشک خود استفاده کنید.

• در صورتی که چشم شما پانسمان شده است تا ۳ ساعت پانسمان را روی چشم نگه دارید.

• از وارد کردن آب به چشم و شنا به مدت چند روز خودداری کنید. شستن سر و صورت و استحمام بعد از ۲۴ ساعت مجاز است.



• ممکن است تا چند ساعت به دنبال تزریق دید مناسب نداشته باشید پس تا برگشت دید مناسب از انجام کارهای دقیق مانند رانندگی و همچنین کارهای پرخطر خودداری کنید.

• بهتر است که روز اول بعد از تزریق از گرد و خاک و باد دوری کنید.

• از ورزش، فعالیت شدید بدنی، بلند کردن اجسام سنگین و خم شدن بپرهیزید.

• انجام کارهای معمولی و دفتری، مطالعه و تماشا کردن تلویزیون مجاز است.

• برای معاینات بعدی حتماً در زمان تعیین شده به پزشک خود مراجعه نمایید.

