



لاپاراسکوپی



واحد آموزش سلامت

فروردین ۱۴۰۵

منبع:

کتاب داخلی جراحی برونر و سودارث/ ۹۷

مقدمه:

مشاهده حفره لگن با استفاده از دوربین مخصوص لاپاراسکوپی را لاپاراسکوپی می گویند. در این روش، جراح، تحت شرایط استریل، ضمن بررسی تشخیصی حفره لگن در صورت لزوم اقدام به برداشتن نمونه می نماید.

اعمالی که می تواند با لاپاراسکوپی صورت گیرد شامل:

۱. مشاهدات تشخیصی در مواردی نظیر درد مزمن یا حاد لگن

۲. اعمال زنان (بستن لوله های رحم توسط لاپاراسکوپ و به کمک حلقه های پلاستیکی یا کلیپس های فلزی، بررسی علل نازایی، انسداد لوله های رحم)

۳. کله سیستکتومی

مزیت های لاپاراسکوپی:

۱. زیبایی (کوچک بودن برش جراحی)
۲. حرکت زود هنگام بعد از عمل
۳. بستری کوتاه مدت در بیمارستان
۴. کاهش درد بعد عمل
۵. بهبود عملکرد ریوی
۶. چسبندگی کمتر بافت ها

معایب لاپاراسکوپی:

احتمال آسیب به پرده های پوشاننده ی ریه ها وجود دارد که البته این احتمال بسیار ضعیف است.

مراقبت های شب قبل از عمل:

* به شما در مورد نحوه ی انجام جراحی

لاپاراسکوپی، توضیح داده می شود.

* باید از شب قبل ناشتا باشید.

* آزمایشات لازم مانند آزمایش خون و ادرار

و نوار قلب داشته باشید. (در افراد دارای سن

بالای ۴۰ سال و افرادی که مشکلاتی از قبیل

فشار خون بالا دارند.)

* عکس ریه داشته باشید. (افراد بالای ۶۰

سال)

* اگر حساسیت به دارویی دارید به اطلاع

پرستاران برسانید.

مراقبت های قبل از عمل:

* یک مسیر رگی مناسب جهت وصل کردن

سرم برای شما گرفته میشود.

* موهای ناحیه عمل تراشیده و تمیز میشود.

* در صورتی که دندان مصنوعی داشته باشید

به پرستار بگویید تا آن را تحویل همراهانتان

بدهد.

* تمام جواهرات و اشیای فلزی خود را در

بیاورید.

مراقبت های حین عمل:

* روی تخت جراحی به پشت می خوابید.

* به شما سند ادراری وصل می شود.

* کارکرد قلب و فشار خون شما توسط

پرستار و متخصص بیهوشی کنترل می شود.

* بیهوشی کامل می شوید.



اقدامات بعد از عمل:

- تا زمانیکه پزشک یا پرستار به شما اجازه نداده از

تخت خارج نشوید. جهت خارج شدن از تخت

برای بار اول از کمک بهیار کمک بخواهید.

- در صورت تهوع و استفراغ نگران نباشید این

مورد عارضه داروهای بیهوشی است. جهت کمک

گرفتن پرستار را مطلع نمایید.

- اگر تا چند ساعت بعد از عمل نتوانستید ادرار

کنید حتما اطلاع دهید.

- هنگامی که پزشک اجازه شروع تغذیه را بدهد

ابتدا مایعات میل نموده و در صورت تحمل، غذای

جامد بخورید.

- چون از کمر بی حسی شده اید تا ۸ ساعت بعد

از عمل در وضعیت خوابیده به پشت بمانید و به

آرامی جا به جا شوید.

- در صورت داشتن درد، پرستار را مطلع کنید تا با

تزیق مسکن درد شما بهبود یابد.

- پانسمان ناحیه عمل ۴۸ ساعت بعد باید برداشته

شود و دیگر نیاز به پانسمان نیست.

- محل زخم را تمیز نگه دارید. در صورت قرمزی و

تورم محل عمل یا داشتن تب و درد ناحیه شکم به

پزشک مراجعه کنید.

- ۷ روز بعد از عمل جراحی برای کشیدن بخیه به

پزشک (در درمانگاه جراحی بیمارستان) مراجعه

نمایید.

- ۲ هفته از انجام کارهای سنگین خودداری کنید.

- داروهای تجویز شده توسط پزشک را در منزل

طبق دستور در ساعت معین، مصرف نمایید.