




بیمارستان شهدای سلامت ملارد

## هایفما

### ( خونریزی اتاقک قدامی چشم )



منبع : داخلی و جراحی برونر

تاریخ بازنگری: فروردین ۱۴۰۵

مدیر گروه چشم : دکتر مهدی نوری متخصص چشم

واحد آموزش سلامت

## مراقبت های ویژه :

بیماری که یک بار دچار هایفما شده است باید در تمام طول عمر خود مانع از وقوع آسیب مجدد به چشم شود.

به همین دلیل ادامه فعالیت های ورزشی که ممکن است همراه با ضربات وارده به ناحیه چشم باشند ( مانند ورزش های رزمی ) توصیه نمی شود.

علاوه بر این ، چشم آسیب دیده همواره حساس تر از چشم سالم خواهد بود و به همین دلیل حتی اگر ضربه ای جزئی به چشمی که سابقه هایفما دارد ، وارد شد باید جدی گرفته شده و در اسرع وقت معاینه شود.

در پایان ، مجددا یادآوری می شود که پس از بهبود مرحله حاد هایفما ، معاینات دوره ای برای تمامی طول عمر لازم است.

در مراجعات چشم پزشکی حتما به پزشک خود در مورد سابقه هایفما اطلاع دهید تا معاینات مربوطه انجام شود.

در صورتیکه هایفما شدید باشد و خون قسمت عمده ای از اتاق قدامی را پوشانده باشد ، ممکن است باعث رنگ گرفتن قرنیه چشم شود که این عارضه به خصوص در کودکان کمتر از ۹ سال به دلیل خطر ایجاد تنبلی چشم بسیار مهم است.

بنابراین تا زمان جذب شدن کامل خون داخل چشمی ، معاینات روزانه توصیه می شود.

در بزرگسالان بروز این عارضه می تواند باعث تاخیر در روند بهبودی بینایی حتی تا ۲ سال گردد. به خاطر داشته باشید که در خونریزی های داخل چشمی یا به عبارت دیگر هایفما که ناشی از ضربه باشد ، عموما سایر اجزای چشم مثل مردمک ، عدسی ، شبکیه و حتی عصب بینایی ممکن است آسیب دیده باشند ، بنابراین ممکن است علیرغم بهبودی هایفما ، دید بیمار بهبود نیابد.

در این موارد امکان دارد نیاز به اقدامات تشخیصی درمانی اضافی جهت بررسی آسیب های همراه وجود داشته باشد.

## هایفما

خونریزی به داخل اتاق قدامی چشم تحت عنوان هایفما (Hyphema) شناخته می شود.

هایفما می تواند خود به خود و یا به دنبال بیماری های چشمی خاص روی دهد ولی شایع ترین عامل آن ضربات وارده بر چشم است.

علت بروز هایفما پارگی عروق موجود در ریشه عنبیه (قسمت رنگی چشم) است.

### علل ایجاد کننده :

۱- ضربات وارده به چشم

۲- به دنبال جراحی های داخل چشم

۳- به صورت خود به خودی

مورد اخیر به دلیل بیماری های چشمی که باعث رشد عروق جدید در اتاق قدامی چشم می شوند مانند دیابت به وجود می آید.

بعضی از ضایعات مادرزادی چشمی هم می توانند در کودکی باعث بروز هایفمای خود به خودی شوند.

### علائم و نشانه ها :

۲- درد چشم

۳- مشاهده رسوب خون در داخل چشم

### درمان :

در صورتی که هایفما به دلایلی مثل بیماری دیابت ایجاد شده باشد ، درمان بیماری زمینه ای جزء اصلی اقدامات درمانی را تشکیل می دهد.

### نکته مهم در درمان هر نوع از هایفما :

استراحت مطلق در بستر به حالت نیمه نشسته است که باعث رسوب خون ، پیشگیری از عود خونریزی و تسریع در جذب لخته خون می شود.

تماشای تلویزیون و مطالعه کردن بی خطر هستند. مدت زمان استراحت حداقل ۵ روز است. پس از این دوره می توان فعالیت های عادی روزمره را به تدریج از سر گرفت.

درمان هایفما عمدتاً دارویی است ولی در موارد خاصی ممکن است اقدامات جراحی نیز ضرورت پیدا کند.

استفاده از آسپیرین در این دوره مجاز نیست ولی برای کاهش درد می توان از استامینوفن استفاده کرد. استفاده از سایر داروهای ضد انعقادی مثل وارفارین باید تحت نظر و با تجویز پزشک انجام گیرد.

لازم است در دوران استراحت از وارد شدن هر نوع ضربه ای به چشم جدا جلوگیری شود و برای این منظور گذاشتن (شیلد) پوشش پلاستیکی روی چشم آسیب دیده الزامی است.

### عوارض :

تاری دید ناشی از هایفما طی دوره درمان به تدریج کاهش می یابد و در صورتی که عارضه دیگری بطور همزمان ایجاد نشده باشد باید طی ۲ هفته دید به حالت اولیه باز گردد.

افزایش فشار داخل چشمی از خطرناک ترین عوارض هایفما است که زمان بروز آن می تواند از ابتدای بروز هایفما تا حتی سال های بعد متغیر باشد ، بنابراین لازم است بیماری که یک بار مبتلا به عارضه هایفما شده به طور مرتب هر چند ماه یکبار ویزیت شده و فشار داخل چشم او اندازه گیری شود.

لازم به ذکر است که افزایش فشار داخل چشمی عموماً توسط خود بیمار قابل تشخیص نیست و به همین دلیل معاینات دوره ای منظم الزامی هستند.